



CarePoint Anesthesia

## Instrucciones post operatorios

*Para pacientes pediátricos u hijos que han sido sometidos a anestesia general además de los procedimientos dentales hoy. Por favor, lea y siga las instrucciones a continuación para el resto del día para maximizar la seguridad de su hijo.*

1. No deje a su niño solo, ni siquiera por un momento, para los próximos 6 a 8 horas. El medicamento que su hijo ha recibido hoy puede seguir teniendo efectos duraderos que pueden variar durante este periodo de tiempo. Aunque su hijo ha cumplido con criterios de descarga adecuada antes de salir de la oficina dental, de vez en cuando factores tales como la ingesta de alimentos, cambios en la estimulación del medio ambiente, resolución del dolor y otros factores pueden causar que su niño sea un poco soñoliento o descoordinado. Ver a su hijo a menudo si se queda dormido. Es normal que un niño quiere descansar durante el resto del día, sin embargo, es importante estar más atentos que la posición de la cabeza de su hijo facilite la respiración. Esto significa que la barbilla de su hijo no deba ser bajado en el pecho, como esto puede obstruir las vías respiratorias.
2. No permita que su hijo participe en físicamente exigentes actividades (deportes, etc.). Aunque su hijo puede parecer estar totalmente despierto y alerta y solicite participar en tales actividades, la coordinación y la capacidad de reaccionar a responder durante la actividad física pueden continúan siendo deterioradas y conducir a lesiones no intencionales.
3. Se recomienda claro líquidos están dadas u ofreció tan pronto como sea posible mientras su hijo pide y lo tolera. Otros líquidos y alimentos deben ser avanzados como el niño lo tolera. A veces su niño puede vomitar o tener náuseas como alimento y el líquido se dan – por esta razón es importante comenzar a líquidos claros primero para asegurarse de que pueden tolerar el siguiente nivel de consumo. Anime a su hijo que ingesta mucho líquido lo más posible durante todo el día ya que esto ayudará a su hijo recuperarse de los medicamentos que él o ella han recibido. Es importante que su hijo no se deshidrate. Los efectos duraderos de los medicamentos combinados con un estado de deshidratación es una situación peligrosa.
4. Estrategias para controlar el dolor habrá sido discutidos antes de la descarga. Es importante que siga estas instrucciones cuidadosamente. Por lo general, en el mostrador paracetamol (tylenol) o ibuprofeno (motrin, advil) están bien consumir como indique las recomendaciones del fabricante según sea necesario para el dolor.
5. Mientras la boca de su niño está todavía adormecida de la anestesia local no debería darle bebidas calientes o alimentos duros. Asimismo, tenga cuidado que no se muerda en las mejillas, labios/lengua o alrededor de la boca. El paciente no puede sentir que él o ella esta traumatizando los tejidos de la boca y puede desarrollar una úlcera. El entumecimiento generalmente dura 3-4 horas.

**Por favor llame a nuestro número de 24 horas si observan alguna de las siguientes:**

1. Su hijo todavía aparece somnolencia y letargo y 'no este normal' después de 6 horas
2. Persistentes de náuseas o vómitos (una o dos veces el vómito es normal, pero extendidas episodios de vómitos no es normal)
3. Su hijo comienza a comportarse extrañamente

4. Hay sangrado persistente, excesiva
5. El niño desarrolla una fiebre alta (por encima de 100 grados f) o erupción
6. Su hijo sigue experimentando un dolor que no se alivia por sobre los medicamentos de mostrador

**Llame inmediatamente al 911 si observa lo siguiente:**

1. su hijo es incapaz de ser despertado – no responde o no va a seguir órdenes
2. el niño tiene dificultad para respirar
3. su hijo tiene una convulsión
4. Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo inminente nuestros números de 24 horas se enumeran. No dude en llamar si tiene alguna pregunta con respecto a la seguridad de su hijo.

**Dr. Jackstien (720) 606-4220 ext 3 (Espanol)**

**Dr. Yen (720) 606-4220 ext 4**

**Dr. Smith (720) 606-4220 ext 6**

**Dr. Croft (720) 606-4220 ext 7**

**Dr. Moezzi (720) 606-4220 ext 8 (Espanol)**

**Dr. Mendoza (720) 606-4220 ext 10**

**Dr. Rees (720) 606-4220 ext 12**